

Übung zur Vorlesung

Theoretische Physik III/IV für Lehramtskandidaten

SoSe 2019

Blatt 12

28.06.2019

Dr. Schank

mit Tom Schmit, Francesco Rosati, Rebecca Kraus

Ihre Lösung ist in Form einer Einzelabgabe bis zum 05.07.19 um 16 Uhr in das Postfach von Prof. Dr. Giovanna Morigi im Erdgeschoss von Gebäude E2 6 einzuwerfen

Aufgabe 35 *Maximum der Entropie*

Betrachten Sie ein abgeschlossenes System, das aus zwei zunächst ebenfalls abgeschlossenen und im Gleichgewicht befindlichen Teilsystemen mit den Werten E_1, N_1, V_1 bzw. E_2, N_2, V_2 für die Energie, das Volumen und die Teilchenanzahl besteht.

- a) Zeigen Sie, dass die Entropie des Gesamtsystems die Form

$$S_{1,2} = \frac{3}{2}k_B (N_1 \ln(E_1) + N_2 \ln(E_2)) + \text{Terme} ,$$

die unabhängig von den Energien sind, besitzt.

(1 Punkt)

- b) Die beiden Teilsysteme werden nun miteinander in Kontakt gebracht, so dass sie untereinander Energie austauschen können. Die Teilsysteme tauschen nun solange Energie aus bis sich ein Gleichgewicht eingestellt hat und die Entropie des abgeschlossenen Systems maximiert wird. Leiten Sie eine Beziehung zwischen den Energien \tilde{E}_1 und \tilde{E}_2 der Teilsysteme her, die die Entropie des Systems maximieren.

(2 Punkte)

- c) Diese Aufgabe soll Ihnen demonstrieren, dass das Maximum der Entropie im mikrokanonischen Ensemble ein sehr scharfes Maximum ist. Betrachten Sie zu diesem Zweck die Entropie für die Energien $E'_1 = \tilde{E}_1 \pm \Delta$ und $E'_2 = \tilde{E}_2 \pm \Delta$, die sich von den Energien, die die Entropie maximieren, um Δ unterscheiden. Leiten Sie zudem einen Ausdruck für die Entropie her für sehr kleine Änderungen der Energie \tilde{E}_1 und \tilde{E}_2 ($\Delta/\tilde{E}_1 \ll 1$ & $\Delta/\tilde{E}_2 \ll 1$).
Hinweis: Die folgenden Entwicklungen können dabei hilfreich sein

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} , \quad \ln(1-x) = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$$

(2 Punkte)

- d) Berechnen Sie die Anzahl der Mikrozustände $\Omega_{1,2}$ im Gesamtsystem für die Energien E'_1 und E'_2 der Teilsysteme. Sie sollten den folgenden Ausdruck

$$\Omega_{1,2} = (\Omega_{1,2})_{max} \exp \left[-\frac{3}{4} \frac{\Delta^2}{E^2} N^2 \left(\frac{1}{N_1} + \frac{1}{N_2} \right) \right]$$

erhalten, wobei E die Energie des abgeschlossenen Gesamtsystems darstellt. (1 Punkt)

- e) Berechnen Sie den Faktor um den $\Omega_{1,2}$ kleiner ist als der Maximalwert $(\Omega_{1,2})_{max}$ für $N_1 = N_2 = 5 \cdot 10^{22}$ und $\Delta/E = 10^{-10}$. (1 Punkt)

Aufgabe 36 *Mischung zweier Gase*

Aus der Vorlesung ist Ihnen die Entropie eines idealen Gases aus N Teilchen mit der Gesamtenergie E in einem abgeschlossenen System mit dem Volumen V bekannt:

$$S(E, V, N) = k_B N \left[\ln \left(\frac{V}{N} \right) + \frac{3}{2} \ln \left(\frac{E}{N} \right) + \frac{5}{2} + \ln(C) \right] \quad (1)$$

wobei C eine Konstante darstellt.

- a) Leiten Sie die Entropie des idealen Gases als Funktion von der Temperatur T , des Volumens V und der Teilchenanzahl N in diesem abgeschlossenen System her. Sie sollten den Ausdruck

$$S(T, N, V) = k_B N \left[\ln \left(\frac{V}{N} \right) + \frac{3}{2} \ln \left(\frac{3}{2} k_B T \right) + \frac{5}{2} + \ln(C) \right] \quad (2)$$

erhalten.

(1 Punkt)

- b) Betrachten Sie nun ein abgeschlossenes System mit zwei Kammern, die durch eine Trennwand separiert sind und mit zwei verschiedenen idealen Gasen A und B unter gleichem Druck und bei gleicher Temperatur gefüllt sind. Die Kammer mit dem Gas A besitzt ein Volumen von V_A und N_A Teilchen. Die Kammer mit N_B Teilchen der Sorte B besitzt ein Volumen von V_B . Geben Sie einen Ausdruck für die Entropie des Gesamtsystems an. (1 Punkt)
- c) Nun wird die Trennwand zwischen den beiden Systemen heraus gezogen und die beiden Gase können in den ganzen Behälter diffundieren, bis sie eine neue Gleichgewichtssituation erreichen. Temperatur und Druck ändern sich bei diesem Prozess nicht. Die Entropie nimmt jedoch um einen bestimmten Betrag zu. Bestimmen Sie den Betrag, um den die Entropie durch das Mischen der beiden Subsysteme zunimmt. (2 Punkte)
- d) Betrachten Sie nun zwei identische Gase $A = B$ in den zwei Kammern. Berechnen Sie ebenfalls die Entropieänderung beim Mischen der beiden Subsysteme. (2 Punkte)