

Score Sheet: Tamoxifeninjektion bei juvenilen Tieren

Punktwertung	0	1	5	10	20	
Körpergewicht	Anstieg	Unbeeinflusst	Abfall < 5 %	Abfall 5 – 10 %	Abfall > 10 %	
Allgemeinzustand	- Fell glatt, glänzend - Körperöffnungen sauber - Augen klar, glänzend	- Felldefekte (verminderte oder übersteigerte Körperpflege)	- Ungepflegte Körperöffnungen - Augen trüb, eingesunken - erhöhter Muskeltonus - Felldefekte an/um Injektionsstelle	- Schmutziges, ungepflegtes Fell (nicht verursacht durch Öl des Tamoxifens) - verschmutzte Körperöffnungen - unnatürliche Körperhaltung - Augen trüb, eingesunken - hoher Muskeltonus	- Verkrampfung - Lähmungen - Atemgeräusche - Tier fühlt sich kalt an	
Spontanverhalten	- Normales Verhalten (schlafen, Neugier, Sozialkontakte, Reaktion auf Berührung)	- Geringe Abweichung vom Normalverhalten (nicht gesteigerter Fluchtinstinkt nach der 1. Injektion)	- Ungewöhnliches Verhalten (z.B. eingeschränkte Motorik, Hyperkinetik)	- Selbstisolation - Lethargie - ausgeprägte Hyperkinetik - Verhaltensstereotypen - Koordinationsstörungen	- Automutilation	
Klinischer Befund	- Atmung normal - Extremitäten warm - Schleimhäute gut durchblutet	- geringe Abweichung vom Normalzustand	- Atmung erhöht (vor der Fixation)	- Atmung deutlich erhöht (vor der Fixation)	- Atmung stark erhöht (vor der Fixation)	
					Gesamtpunktzahl:	

Punktesummen:

0	= Belastungsgrad 0	= keine Belastung	
1 – 9	= Belastungsgrad 1	= geringe Belastung:	Weiter beobachten Injektionen fortführen
10 – 19	= Belastungsgrad 2	= mittelgradige Belastung:	Weiter beobachten Injektionen einstellen, Versuchsleiter (Initiator) informieren
20 oder >	= Belastungsgrad 3	= hochgradige Belastung:	Tier sofort euthanisieren